

Tandskifte og tandudvikling

"Nyt Dansk Jagtleksikon", Branner og Korch, 1974, Red. Weitemeyer og Hansen under emnet "Kronvildt" af emneforfatter: H. Strandgaard, dr.phil. Vildtbiologisk Station. Side 1358 -1359:

Aldersbestemmelse: Indtil dyrene er ca. 28 mdr. gamle kan en sikker aldersbestemmelse foretages på grundlag af tandskifte og tandudvikling. Skemaet viser tandskiftets forløb i underkæben. Almindelige (arabiske) tal angiver mælketænder; romertal angiver blivende tænder. Præmolarer = små (forreste) kindtænder – molarer = store (bageste) kindtænder.

alder i mdr.		fortænder				kindtænder			molarer	
						præmolarer				
juni	1	1	2	3	4	1	2	3		
juli-sept.	2-4	1	2	3	4	1	2	3		
okt.-april	5-11	1	2	3	4	1	2	3	IV	
maj-juli	12-14	1	2	3	4	1	2	3	IV	V
aug.	15	I	2	3	4	1	2	3	IV	V
sept.-nov.	16-18	I	II	3	4	1	2	3	IV	V
dec.-febr.	19-21	I	II	III	4	1	2	3	IV	V
marts-juli	22-26	I	II	III	IV	1	2	3	IV	V
aug.-sept.	27-29	I	II	III	IV	I	II	III	IV	V
okt.	29	I	II	III	IV	I	II	III	IV	V VI



Underkæber af kronvildt. – Den øverste kæbe er fra et 2 1/2 år gammelt dyr, den midterste fra et 1 1/2 år gammelt og den nederste fra et på 1/2 år.
(Fot. FK)